

Overzicht van geneesmiddelen met specifiek preoperatieve medicatieadviezen

Meest recente versie steeds terug te vinden op: azg.site/preop_medicationadvies

1. Algemene richtlijnen

Geneesmiddelenklasse	Laatste inname
CARDIOVASCULAIR STELSEL	
ACE-inhibitoren en Angiotensine Receptor Blokkers	24 uur voor operatie
Diuretica	Dag voor operatie
Anticoagulantia en anti-aggregantia	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be . In de bridging link zijn de richtlijnen verwerkt in een handige adviserende tool specifiek voor uw patiënt.
	<i>Uitzondering: voor cataractchirurgie: continueer alle anticoagulantia en anti-aggregantia</i>
HORMONAAL STELSEL	
Antidiabetica	Zie schema's hieronder.
ZENUWSTELSEL	
MAO-inhibitoren	1) antidepressiva: - Fenelzine: > 14 dagen voor operatie - Moclobemide: avond voor operatie
	2) <i>Uitzondering: antiparkinsonmiddelen: doorgeven</i>
ANDERE	
Voedingssupplementen	1) Sint-Janskruid: > 7 dagen voor operatie
	2) Ginkgo Biloba: > 7 dagen voor operatie

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

cataractchirurgie oogdruppels (inclusief glaucoomdruppels) moeten niet onderbroken worden
indien verschillende oogdruppels: minimum 5 minuten tussen de verschillende toedieningen
tamsulosine moet niet onderbroken worden: het volstaat dat de oogchirurg op de hoogte is van het gebruik van deze medicatie

Indien slikproblemen, mag medicatie ook met bv. Gloup® (zero) slikgel ingenomen worden.

2. Alfabetische lijst van geneesmiddelen met specifieke preoperatieve medicatieadviezen.

Via de zoekfunctie of 'control-F' vindt u het geneesmiddel snel terug.

naam GM	klasse	Laatste inname/toediening
Aacidexam (dexamethasone)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Abasaglar	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Accupril (=uit de handel: januari 2023)	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Accuretic (uit de handel, april 2022)	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
acetylsalicylic acid krka	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
acetylsalicylzuur	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Actrapid (= uit de handel: september 2023)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt : gewone dosis
Adoport (tacrolimus)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Advagraf (tacrolimus)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Aggrenox (= uit de handel)	anti-aggregans	
Afebryl	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Afinitor (everolimus)	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Aldactazine (= uit de handel: juni 2019)	diureticum	dag voor operatie
Aldactone	diureticum	dag voor operatie
Alecensa	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Amarylle	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Amgevita (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Amlodipine + valsartan + hydrochloorthiazeide	calciumantagonist + sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Apidra	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt : gewone dosis
Alunbrig	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Apixaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Apremilast	tsDMARDs	niet onderbreken
Aprovel	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Arava (leflunomide)	csDMARDs	niet onderbreken
Arixtra	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens
Asa EG	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be

Asaflow	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Aspegic	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Aspirine	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Aspirine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Aspirine C	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Atacand	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Atacand plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
atenolol + chloortalidon	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Avtozma (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken
Axitinib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
azathioprine	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Balversa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Belsar	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Belsar plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Benepali (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken
Benlysta (belimumab)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken
Bespres	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Bio-flow	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Bimzelx (bimekizumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken
Bipressil	betablokker + ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Braftovi (encorafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Bosulif	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Bosutinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Brilique	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Brukinsa	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Burinex	diureticum	dag voor operatie
Bydureon (= uit de handel: december 2024)	incretinemimetikum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie
Cabometyx	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Calquence	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Candesart plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
candesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
candesartan + HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
candesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
cangrelor	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Caprelsa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
captopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Cardioaspirine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Cellcept (mycophenolaat)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Celestone (betamethason)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Cibinqo (abrocitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.

Cimzia (certolizumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Clexane	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie
clopidogrel	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Co-amiloride (= uit de handel: september 2019)	diureticum	dag voor operatie
Co-aprovel	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Co-bespres (= uit de handel: oktober 2020)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
co-bisoprolol	betablokker + diureticum	dag voor operatie
co-candesartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Co-diovane	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
co-enalapril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Cognifit	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Cogniton	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Co-inhibace	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
co-lisinopril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
co-losartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Combodart	(combinatiepreparaat: solifenacine/tamsulosine)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!
co-olmesartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Coperindo	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
co-ramipril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Coramlo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
co-renitec	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Cosentyx (secukinumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken
Cotellic (cobimetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
co-valsartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Coveram	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Coversyl	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Coversyl plus	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Cozaar	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Cozaar plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Dabigatran	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Dailiport (tacrolimus)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Daonil	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Dasatinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Depo-medrol	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
dexamethasone	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Diamox	diureticum	dag voor operatie
Diovane	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Diprophos (betamethason)	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
dipyridamole (uit de handel: december 2022)	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Excedryn Migraine en hoofdpijn	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Edoxaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Efient	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be

Eliquis	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be
Emcoretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie
enalapril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
enalapril + lercanidipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Emthexate (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Enbrel (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken
Entresto	sacubitril + valsartan	niet te onderbreken (indicatie: hartfalen)
Eplerenone	diureticum	dag voor operatie
Erelzi (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken
Erlotinib	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Eucreas	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Exforge	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Exforge HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Everolimus	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Fenelzine	MAO-inhibitor	> 14 dagen voor operatie
Fiasp	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis</i>
Finlee (dabrafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Flixabi (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Fludex	diureticum	dag voor operatie
Focuzine	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Forxiga	oraal antidiabeticum	dag voor operatie
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	dag voor operatie
	chronische nierschade bij volwassenen	dag voor operatie
Forzaten	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Forzaten HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Fosinil	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Fragmin (uit de handel: december 2022)	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens
Fraxiparine	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie
		indien therapeutisch: 24 uur voor operatie
Fraxodi (altijd 1 keer per dag!)	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens
Frusamil	diureticum	dag voor operatie
Fruzaqla	VEGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Furosemide	diureticum	dag voor operatie
Galvus	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Ghemaxan	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie
		indien therapeutisch: 24 uur voor operatie
ginkgo biloba	voedingssupplement	> 7 dagen voor operatie
Gefitinib	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!

Giotrif	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Glibenese	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
gliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
glimepiride	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Glivec	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Glucobay (uit de handel: februari 2023)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Glucophage	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens
Glurenorm (uit de handel: februari 2025)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Hukyndra (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Hulio (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Humalog	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis
Humalox mix 25	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Humalog mix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Humira (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Humuline 30/70	combinatiepreparaat: klassieke insulines	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Humuline NPH	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Humuline regular	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis
hydrocortisone	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
hydrocortisone (Solu-Cortef)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Hygroton	diureticum	dag voor operatie
Hyperiplant	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie
Hyporetic (= uit de handel: januari 2023)	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Hyrimoz (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Ibrance (palbociclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Iclusig	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Idacio (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Ilaris (canakinumab)	IL-1 inhibitoren	niet onderbreken
Imatinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Imbruvica	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Imraldi (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken

Imuldosa (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Imuran (azathioprine)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Indapamide	diureticum	dag voor operatie
Inhibace	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Inlytia	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Innohep	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens
Inrebic	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!
Inspra	diureticum	dag voor operatie
Insulatard (= uit de handel: september 2025)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden
insulinepomp subcutaan (SC)	bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid	nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. <i>Indien nuchter na ontbijt:</i> gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme
		opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.
Insuman basal (uit de handel: januari 2023)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Insuman rapid (uit de handel: januari 2023)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt:</i> gewone dosis
Invokana	oraal antidiabeticum	dag voor de operatie
irbesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
irbesartan + HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
irbesartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Iressa	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Jakavi	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!
Jaypirca	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Janumet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Januvia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Jardiance	oraal antidiabeticum	dag voor operatie
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	avond voor operatie
Jentadueto	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Jyseleca (filgotinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.
Kenacort A (triamcinolone)	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Kengrexal	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Kevzara (sarilumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken
Kineret (anakinra)	IL-1 inhibitoren	niet onderbreken
Kinzalkomb (uit de handel: januari 2023)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Kinzalmono	sartaan	dag voor operatie 's morgens

Kisplyx	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Kisqali (ribociclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Komboglyze (uit de handel: juli 2022)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Koselugo (selumetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Kyntheum (brodalumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken
Lazcluze	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Lantus	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Lasix	diureticum	dag voor operatie
Ledertrexaat (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Leflunomide	csDMARDs	niet onderbreken
Lenvima	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Levemir	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Lipercosyl	statine + ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Lipertance	statine + ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
lisinopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Litfulo (ritlecitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.
Lixiana	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Lodoz	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Loortan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Loortan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Lorviqua	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
losartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
losartan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Lynparza (olaparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Lyumjev	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie.
Mabthera (rituximab)	monoklonale antilichamen	Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis niet onderbreken
Marcoumar	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Marevan	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Maxsoten	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Medrol	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Mekinist (trametinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Mektovi (binimetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Memixx	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Memoptic	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Memovital	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie

Metformax	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens
Metformine	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens
Methofill (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Metoject methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Micardis	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Micardis plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Millepertuis Sint-Janskruid	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie
Milperinol	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie
Minidiab	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
moclobemide	MAO-inhibitor	avond voor operatie
Mounjaro	diabetes/gewichtsbeheersing	meer dan 6 dagen voor operatie
Mycophenolat mofetil	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Myfenax (mycopenolaat)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Myfortic (mycopenolzuur)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Mysimba	obesitas	3 dagen voor de operatie
Nardelzine (= uit de handel: juni 2019)	MAO-inhibitor	> 14 dagen voor operatie
Neoral-Sandimmun (ciclosporine)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Nepexto (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken
Nexavar	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Nilotinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Nobiretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Novomix 30	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Novomix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Novomix 70 (= uit de handel, januari 2022)	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos
Novonorm	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Novorapid	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis
olmesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
olmesartan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
olmesartan plus HCT	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
olmesartan + amlodipine	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
olmesartan + amlodipine + HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens
olmesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Olmotec	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Olmotec plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Olumiant (Baricitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.

Omic	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen!
Omjara	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!
Onglyza	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Orencia (abatacept)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken
Otufi (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Ozempic	incretinemimetikum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie
Pazopanib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Pemazyre	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Peramteva	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Perdolaan compositum	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
perindopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
perindopril + amlodipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
perindopril + indapamide Sandoz	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
perindopril + amlodipine + indapamide	ACE-inhibitor + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Piqray	PI3K-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Plaquenil (hydroxychloroquine)	csDMARDs	niet onderbreken
Plavix	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Pradaxa	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
prednisolone	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
prednisone	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Preterax	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Prograft (tacrolimus)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Pyzchiva (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Qinlock	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
quinapril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
ramipril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
ramipril + amlodipine (uit de handel: november 2024)	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
ramipril + HCTZ (hydrochloorthiazide)	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Ranomax	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen!
Rastinon (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Remicade (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Remsima (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Renitec	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Repaglinide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Retsevmo	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Rinvoq (upadacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.
Rivaroxaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Rixathon (rituximab)	monoklonale antilichamen	niet onderbreken

Roactemra (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken
Rozlytrek	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Rubraca (rucaparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Rybelsus	incretinemimeticum (oraal)	meer dan 6 dagen voor operatie
Rydapt	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Salazopyrine (sulfasalazine)	csDMARDs	niet onderbreken
Sandimmun (ciclosporine)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.
Saphnelo (anifrolumab)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken
Saxenda [liraglutide]	incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas)	meer dan 6 dagen voor operatie
Scemblix	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Sectrazide (= uit de handel: mei 2022)	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Sedergine	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Segluromet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Sevikar	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Sevikar HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Simponi (golimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
sint-janskruid (=Hypericum perforatum)	voedingssupplement	> 7 dagen voor operatie
Sintrom	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Sitagliptine	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Sitagliptine + Metformine	oraal antidiabeticum	dag voor operatie 's morgens
Solu-medrol	Glucocorticoiden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.
Sorafenib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Sotyktu (deucravacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.
Spexotras (trametinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
spironolactone	diureticum	dag voor operatie
Sprycel	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Steglatro	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Steglujan	combinatie orale antidiabetica	avond voor operatie
Stelara (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Steqeyma (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Stivarga	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Suliqua (uit de handel: augustus 2021)	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	<i>Indien gepland voor 's morgens:</i> niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. <i>Indien gepland voor 's avonds:</i> mag gegeven worden.
Sunitinib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Sutent	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.

Sylvant (siltuximab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken
Synjardy	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Tafinlar (dabrafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Tagrisso	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Taltz (ixekizumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken
Talzenna (talazoparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Tamsulosine	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!
Tanakan	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Tasigna	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Tavoforce	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Tavonin	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie
Tazko	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
telmisartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
telmisartan plus HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
telmisartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
telmisartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Tenoretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie
Teveten	sartaan	dag voor operatie 's morgens
Teveten plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Ticagrelor	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Ticlid	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
ticlopidine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Tepmetko	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Tibsovo	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
tolbutamide (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
torasemide	diureticum	dag voor operatie
Torrem	diureticum	dag voor operatie
Toujeo <u>Solostar</u>	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i>
Toujeo <u>Doublestar</u>	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i>
Trajenta	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Tresiba	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i>
Trinomia	ACE-inhibitor + statine + acetylsalicylzuur	vraag advies arts omwille van aanwezigheid acetylsalicylzuur (advies ACE-inhibitor: stop dag voor operatie 's morgens)

Triplixam	ACE-inhibitor + calciumantagonst + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Tritace	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Tritazide	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Troc	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie
Trulicity	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie
Truqap	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Truxima (rituximab)	monoklonale antilichamen	niet onderbreken
Tukysa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Twynsta	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Tyenne (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken
Tyverb	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Unidiamcron / uni diamcron / uni-diamcron	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Unigliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Usymro (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Uzpruvo (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
valsartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens
valsartan + amlodipine	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
valsartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Vanflyta	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Vargatef	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Verzenios (abemaciclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Vesomni	benigne prostaathypertrofie (combinatiepreparaat: dutasteride/tamsulosine)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!
Victoza	incretinemimeticum	meer dan 6 dagen voor operatie
Vipdomet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Vipidia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Vitrakvi	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Vokanamet (uit de handel: juni 2021)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Votrient	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Votubia (everolimus)	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Wegovy	obesitas	meer dan 6 dagen voor operatie
Wezenla (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Xalkori	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!

Xarelto (niet meer terugbetaald sinds 1/9/2024)	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Xeljanz (tofacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.
Xigduo	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens
Xospata	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.
Xultophy	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	niet toedienen op dag van operatie
Yesintek (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken
Yuflyma (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Zanicombo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens
Zejula (niraparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Zelboraf (vemurafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.
Zessly (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken
Zestoretic	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Zestril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Zibrine (= uit de handel: juli 2019)	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie
Zopranol	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens
Zopranol plus	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens
Zykadia	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!
Zydelig	PI3K-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preoperatief medicatiebeleid van de patiënt.

Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.

Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

versie: 03072026

contactpersonen: Apr. Julie Van Den Broucke (056/63 50 85), dr. Steelant (056/63 30 56) of dienst anesthesie (056/63 51 55) az groeninge